

GACETA MÉDICA

DE MEXICO.

PERIODICO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA.

Se reciben suscripciones en México, en la librería del Sr. D. José María Aguilar y Ortiz, 1ª calle de Sto Domingo núm. 5, y en el despacho de la imprenta donde se publica esta Gaceta.

En los Departamentos, en la casa de los Sres. corresponsales de la librería de Aguilar y Ortiz. La suscripción es de 25 centavos por entrega y el pago se hará al recibirla el suscriptor.

SUMARIO.

Continuacion del manual de la talla perineal por el procedimiento del Dr. Clément. (Extracto de la tesis inaugural del profesor D. Carlos Fénélon. Ojeada histórica sobre los principales modos de practicar la talla en el hombre para la extracción de la piedra vesical.)—Alcoholismo, por el Sr. D. José G. Lobato.

BIBLIOGRAFIA MEDICA MEXICANA.

Manual de la talla perineal por el procedimiento del Dr. Clément.

(CONCLUYE.)

Quant aux volumes extrêmes que la Lithotritie ne peut aborder, ces cas qui, jusqu'ici, n'ont pas reçu de solution ne se laisseront que trop reconnaître par l'impossibilité d'arriver aux grands diamètres du calcul, jointe aux renseignements que que fourniront alors le palper hypogastrique et le toucher rectal. D'ailleurs, hors d'exceptions très rares et à peine concevables, ces calculs énormes auront été reconnus pour tels avant la Taille périnéale qu'ils contreindiquent formellement, quoi qu'on ait pu faire et dire.

C.—Lorsque la pierre saisie par les tenettes se présente mal, c'est à dire qu'elle s'offre à la Taille par ses plus grandes dimensions, on conseille de la retourner pour amener au passage des dimensions moindres. L'écueil de ce conseil d'une sagesse vulgaire réside dans le défaut de moyens de le rendre pratique.

On dit bien qu'il convient de relâcher le calcul saisi et d'essayer de le reprendre dans un nouveau sens. On dit encore que le calcul libre entre les mors des tenettes sera repoussé du doigt ou du bouton appliqué de côté, de manière à produire l'effet de rotation désiré; mais tout cela, en présence du cas clinique, est d'une incertitude et surtout d'une infidélité sans limites.

La manœuvre suivante nous a réussi; de plus, nous espérons qu'on lui accordera d'être parfaitement rationnelle.

Substituer à la tenette la pince courbe à polypes; saisir avec elle la pierre à une des extrémités de son plus grand diamètre, embrassant entre les mors le point qu'on choisit pour axe de la conversion et faisant que la concavité de la pince corresponde au bord de la plaie vers lequel on saisit la pierre; agir sur l'autre extrémité du calcul, soit avec le doigt, soit avec le bouton, dans la direction vers laquelle on veut pousser l'extrémité libre du diamètre à mouvoir, tandis que la pince bien fixée sur l'axe de rotation se tient immobile ou est attirée lentement dans la plaie, selon l'opportunité,—cela jusqu'à obtention du résultat.

C'en est assez, n'est ce pas, c'en est trop, mon cher Carlos.—J'oubliais pourtant de vous dire quelques mots promis sur la Taille extrà prostatique.

La Taille extrà prostatique légitimée jusque dans ces derniers tems par le manque de moyens convenables pour diviser les pierres de certain volume, n'a plus aujourd'hui d'excuse réellement solide.

Même en admettant que des circonstances exceptionnelles puissent jamais nous autoriser à la pratiquer, elle doit toujours être précédée de l'opération intrà prostatique bilatérale et de la dilatation maxima de la voie.

Dans ce cas, la section de l'enveloppe prostatique et de la partie de la vessie qu'on croit nécessaire d'intéresser doit se faire également d'un côté et de l'autre. Quant à la manœuvre, je la conçois ainsi:

La plaie de la Prostate est maintenue béante et tendue par l'agent dilatatant qu'on a confié à un aide. L'opérateur porte l'index gauche pour le côté droit, le droit pour le côté gauche sur l'extrémité de la plaie qu'il se propose d'étendre.

Le doigt placé entre les cuillers largement entrouvertes du dilatateur reconnaît les parties résistantes du point à attaquer. La main restée libre armée du long bistouri boutonné, porte sur le champ de la division cet instrument guidé par le doigt explorateur, et, toujours, sous la surveillance de ce doigt, coupe les parties qui refusent de céder à la continuation d'un effort modéré de dilatation que soutient l'aide.

Il est mauvais de dépasser la prostate de plus d'un centimètre de chaque côté; plus encore de forcer l'extraction de la pierre jusqu'à en faire un agent de division.

De cette fois, nous en finissons avec ces notes trop longues pour votre Thèse, mon cher Carlos, beaucoup trop courtes pour la matière dont nous avons voulu nous occuper. Il ne me reste qu'à vous souhaiter toute sorte de succès, ce que fait cordialement,—Votre ami

CLÉMENT.




fig. 4.

fig. 5.

fig. 2.

fig. 3.

fig. 1.