

dermis llenas de un líquido á que pronto se vuelve sero-purulento: picadas aunque sea en un solo punto se vacian pronto y en totalidad. *Muchas veces representan con exactitud verdaderas pústulas de impétigo ó de ectyma* [1].

CRONICA ESTRANJERA.

TERAPEUTICA.

Benzina en el tratamiento de la tos ferina.—Las inhalaciones del aire de los sitios donde se purifica el gas de alumbrado ejercen en concepto de Bortari una accion favorable en el tratamiento de la tos ferina siempre que dicha enfermedad está libre de toda complicacion. Segun todas las probabilidades, esta accion es debida á la presencia de la *benzina* que se forma durante la destilacion de la hulla; de lo que se deduce que este remedio puede ser administrado con mucha mas facilidad y á dosis proporcionada en el domicilio mismo del enfermo. La benzina á juicio de aquel profesor es el mejor medicamento contra la tos ferina. Administrásele al interior añadiendo á una cierta cantidad de mucílago ó de jarabe, de diez á veinte gotas del carburo de hidrógeno ya dicho, ó en inhalaciones. [*All. medic. centr. Zcit.*]

Efectos fisiológicos del cuernecillo de centeno.—Conclusiones de la Tesis de Mr. Holmes.—1ª El cuernecillo de centeno y la ergotina hacen contraer á los pequeños vasos de paredes musculares. 2ª La contraccion de las arteriolas hace aumentar la presion arterial en los troncos gruesos. 3ª Dicha accion se estiende aun á los vasos pulmonares, cuya contraccion hace cesar momentáneamente la presion arterial si la ergotina se inyecta por alguna vena. 4ª Estos efectos parecen manifestarse aun despues de la seccion de los nervios vasomotores.

Inyecciones hipodérmicas de narceína.—M. Petrini ha resumido su trabajo relativo á las siguientes conclusiones: 1ª, á dosis muy mínima el chlorohidrato de narceína posee una accion calmante manifiesta; 2ª, como tal es superior á las

[1] Segun el Sr. Muñoz, cuando estas últimas aparecen en individuos sifilíticos el líquido inoculado puede comunicar la sífilis y ser el fundamento tal vez de lo que se ha llamado impropriamente "vacuna sífilica." Tambien ha observado que en los niños que tienen la sífilis hereditaria y en quienes dicha enfermedad está haciendo su evolucion, pueden aparecer sobre el lugar de las picaduras verdaderas pústulas de ectyma sífilico hereditario.

sales de atropina; 3ª, su accion antivomitiva es igual si no superior á la del chlorohidrato de morfina; 4ª, como hipnótico, aun cuanco la morfina y las demas preparaciones de ópιο hayan fracasado, el clorohidrato de narceina á dosis muy mínimas produce efectos soporíficos; 5ª el clorohidrato de narceina obra con la propia eficacia y la misma rapidez sea cual fuere la parte del cuerpo por donde se inyeete; 6ª, aun á dosis mínima el chlorohidrato de narceina produce una elevacion pasagera de la temperatura del cuerpo y aumenta momentáneamente el pulso y la respiracion; al mismo tiempo se observa un abatimiento de la tension arterial.

Solucion de chlorohidrato de morfina para inyecciones hipodérmicas, segun Mr. Hamon.—“En el estuche mismo donde se guarda la geringa de Pravaz llevo siempre un paquetito con cinco centigramos de chlorohidrato de morfina. “Llamado de improviso nada me es mas fácil que obtener en el acto una solucion. Pido una redomita, vierto en ella la sal dicha y 25 gotas de agua: para “procurar la completa solucion del chlorohidrato de morfina sumerjo la vasija “durante algunos minutos en un trasto que tenga agua caliente, lo que consti- “tuye un verdadero baño de María que procura un líquido perfectamente lím- “pido y del cual cinco gotas representan con toda exactitud *un centigramo* de “la sal hipnótica.” [*Journ. des conn. méd.*, Juin 1870].

Bouchardat cree, y con razon, que así se evitaran las alteraciones de las soluciones aquosas de morfina tituladas, alteraciones por otra parte señaladas ya por diversos observadores.

Supositorios contra la hiperestesia vulvar y el vaginismo.—M. Guéneau de Mussy cree que el empleo sábiamente combinado de los medios medicamentosos asociados segun fuere necesario de la dilatacion progresiva ó forzada hará inútiles con frecuencia las incisiones profundas recomendadas en casos de vaginismo pertinaz. Dicho profesor ha obtenido resultados muy felices de la accion de los supositorios vaginales que siguen:

Manteca de cacao.....	2 gramos.
Bromuro de potasio.....	30 centigramos.
Extracto de belladona.....	10 „

Mézclese y hágase un supositorio cilíndrico que se introducirá por la noche dentro de la vagina. Continúese el uso de estos supositorios durante dos ó tres semanas.—M. Guéneau de Mussy aconseja tambien las inyecciones subcutáneas con algunas gotas de la siguiente mixtura.

Agua destilada.....	10 gramos.
Chlorohidrato de morfina.....	50 centigramos.
Sulfato de atropina.....	1 „ M.

Cuando el vaginismo se acompaña de un prurito mas ó menos violento Mr. Guéneau de Mussy emplea al mismo tiempo que los supositorios, una solucion de arseniato de sosa al diezmilésimo á la dosis de una cucharada sopera diaria. [*Gaz. des hôp.*, Juin 1870.]

Chloral hidratado en los partos.—Segun M. Lambert el hidrato de chloral es un agente de gran valor para quitar los dolores de parto. Está demostrado que el trabajo puede ser conducido de principio á fin sin que la mujer sepa lo que le pasa, bajo la influencia exclusiva del chloral. El medio mejor de propinarle es por fracciones de quince granos cada cuarto de hora, hasta obtener los efectos del medicamento. Algunas mujeres necesitan de una dracma [1 gramo, 77]; pero vale mas, segun M. Lambert, producir la anestesia con tres dracmas dadas en el espacio de dos horas que por una dada en una sola vez. Parece que el chloral activa las contracciones uterinas determinando la suspension de todas las acciones reflejas que tiendan á interrumpir de algun modo la excitabilidad de los centros de los movimientos orgánicos.—La dosis empleada es un gramo cada cuarto de hora.

La cubeba en el tratamiento de la diphteria.—Extracto de la Tesis de Mr. Moreau.—Mr. Bergéron ha empleado el *sacaruro de cubeba* preparado por M. Delpech. Diez gramos de esta preparacion contienen un gramo de extracto oleo-resinoso de cubeba: la dosis media es 20 gramos por dia, que se disuelven en agua ó en leche. Por medio de esta preparacion se ha logrado hacer desaparecer el gusto de la cubeba y hasta vencer la renuencia de los niños á quienes se propina.—Los resultados obtenidos durante el año de 1869 dan una media de 38,2 curaciones por cien casos de croup, traqueomizados ó no traqueomizados. En los diversos hospitales de Paris, excepto el *des Enfants-Assistés* hubo 271 casos de garrotillo de los cuales curaron 73, lo que da una media de 26,9 curaciones sobre cien casos. Segun se deduce de la estadística oficial proporcionada á M. Moreau por M. Husson, en el hospital *des Enfants* [rue de Sevres] sobre 123 casos de croup se han logrado 24 curaciones [19,5 por 100]. Como se ve la estadística de M. Bergéron es superior á las otras, por lo que M. Moreau pregunta si seria posible que esta diferencia dependiera de la mayor malignidad del croup en los barrios que en los contornos del hospital *des Enfants*. Hace notar que los resultados obtenidos el año de 1868 en los diphtéricos tratados con la cubeba [9 curaciones sobre 19 casos de croup] dan una media tan favorable como la de 1869; de donde infiere que la influencia del tratamiento de que se trata es innegable.

[Traducidos y arreglados para la "Gaceta" por J. M. Rodriguez.]