
GACETA MÉDICA DE MÉXICO

PERIÓDICO

DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE MÉXICO.

CLÍNICA MÉDICA.

UN CASO DE NEUMONIA DE FORMA INTERMITENTE, PERNICIOSA, ALGIDA

OBSERVACION NUMERO 1.

NEUMONIA DE FORMA INTERMITENTE PERNICIOSA.

Jesus Rodriguez, natural de San Geronimito, Distrito de Galeana, soltero, de 22 años de edad, trabajador del campo y en la descarga de los vapores de esta bahía, temperamento linfático, vive al Oeste de la ciudad en la parte alta; de buenas costumbres, no usa bebidas alcohólicas, jamás ha padecido enfermedad alguna grave.

Dia 9 de Enero, 2.º de su enfermedad.—Fuí llamado á verle en la noche, y me dijo: que al llegar del campo, sudando, se acostó en una hamaca recibiendo todo el aire que entra á la poblacion por el cañon del punto llamado la *Quebrada*: esto fué el dia 8; que á media noche sintió un agudo dolor de costado, bajo de la tetilla izquierda, y se sintió con calentura; que el dia 9 en la mañana aún cuando el dolor le molestaba mucho, no sentia calentura y se levantó á las nueve. A las dos de la tarde sintió mucho calofrio, dolor de cabeza, aumentó el dolor en el costado, y á las tres, aumentando la tos, notó que el esputo era sanguinolento y sentia mucha presion en el pecho, no pudiendo respirar: alarmado por esto me mandó llamar, viéndole por primera vez á las siete de la noche, y presentando al exámen los sintomas siguientes: dolor de cabeza bastante intenso, conjuntiva inyectada, mucha dispnea, dolor muy agudo en el costado izquierdo, temperatura axilar 39°8, pulso á 120, respiraciones 38 por minuto. Hecha la percusion, acusó un sonido oscuro, correspondiente á la base del pulmon, indicando su matitez. Hecha la auscultacion, se notaba la debilidad del murmullo vesicular en la misma base, y el estertor crepitante. Tosia en

esos momentos, y reconocido el esputo lo observé con poco aire y muy sanguinolento.

Tratamiento: un vomitivo de 30 granos de hiepecacuana, é inyecciones de sulfato de morfina en el sitio del dolor.

Día 10, 3.º de enfermedad.—Pulso 100, respiracion 34, temperatura 38º, estertor crepitante, mayor oscuridad en la base del pulmon, conjuntiva ménos inyectada, menor cantidad de sangre en los esputos, ménos dolor en el costado, mucha debilidad, epistaxis á las seis de la mañana como de 180 gramos.

Tratamiento: vino de quina roja 400 gramos; elixir de Boldo 30; jarabe de corteza de naranja amarga q. s., para tomar una cucharada cada dos horas. Por alimento dos cucharadas de jugo de carne y vino tinto mediado con infusion de damiana.

En la noche: temperatura 40º; pulso á 130; dolor muy agudo en el costado; el mismo carácter de expectoracion; crepitation; mayor dispnea; sudor copioso y general en todo el cuerpo.

Tratamiento: inyeccion hipodérmica de sulfato de morfina; las mismas cucharadas alternadas con otras de jarabe balsámico con polvo de Dower; ventosas secas en todo el costado izquierdo.

Día 11, 4.º de enfermedad.—Temperatura 36º5, pulso á 60; respiracion 36; sudor copioso y frio; debilidad suma; estertor crepitante; esputo aereado y ménos sanguinolento, pero un poco más adherente al plato en que está. Emision de orina regular.

Tratamiento: bromhidrato de quinina 30 gramos en 12 pildoras; cucharadas de vino de quina y elixir de Boldo cada dos horas; jugo de carne y vino tinto por alimento.

En la noche: temperatura 39º8, pulso á 120; respiracion 34; ménos dolor en el costado; submatitez en la base del pulmon; estertor ménos crepitante; esputo ménos sanguinolento. El mismo tratamiento.

Día 12, 5.º de enfermedad.—Temperatura 39º; pulso á 100; respiracion 28; orina muy amoniacal, oscura y abundante; lengua húmeda y muy roja en sus bordes; durmió poco y deliró algo en la noche; estertor en el pulmon; esputo ménos sanguinolento y más aereado, pero viene con mucha dificultad, aumentando la dispnea.

Tratamiento: vino de quina, cucharadas de jarabe balsámico, goma, amoniac y kermes, una cada dos horas; la misma alimentacion.

En la noche: temperatura á 40º2; pulso á 130; vuelta del dolor; respiracion 40; submatitez del pulmon; esputo con mucha sangre y muy adherente al plato; epistaxis como de 5 onzas. El mismo tratamiento y una inyeccion de morfina para calmar el dolor.

Día 13, 6.º de enfermedad.—Temperatura 39º; pulso á 100; respiracion 24; ménos submatitez en el pulmon; estertor ménos apreciable; esputo ménos

sanguinolento y con más aire y ménos viscoso; lengua húmeda y bordes rojos; ningun dolor en el costado; durmió mejor, no hubo delirio; orina ménos alcalina, casi rosada y abundante. El mismo tratamiento y la misma alimentacion.

En la noche: temperatura á 39°6; pulso á 100; respiracion 24; ningun dolor; ningun estertor apreciable en el pulmon; submatítez; poca tos y el esputo escaso, pero casi sin sangre. El mismo tratamiento.

Dia 14, 7.º de enfermedad.—Temperatura á 36°; pulso á 48; respiracion 24; sudor copioso y helado; suma debilidad; estertor fino en la base del pulmon; no hay dolor; el esputo sin sangre, con viscosidad y muy poco aire.

Estando aquí bajo la influencia constante de miasmas palustres y observando que la temperatura era muy baja, prescribí bromhidrato de quinina 30 gramos en diez pildoras para tomarlas luego; cucharadas de vino de quina cada dos horas, y friccion general con tintura de quina y mostaza. Alimento: jugo de carne en mayor cantidad y vino tinto.

En la noche: Temperatura á 38°; pulso á 80; respiracion 20; estertor fino y algo de soplo en el pulmon; lengua saburral; ménos submatítez; orina abundante, rosada, ningun dolor. Tratamiento: vino de quina en cucharadas.

Dia 15, 8.º de enfermedad.—Temperatura á 38°5; pulso á 80; respiracion normal; esputo bien aereado, ménos viscoso y más abundante; ligero soplo en el pulmon; disminucion de la tos, ménos submatítez; lengua húmeda y roja en sus bordes; mucho sueño; suma debilidad; mucha postracion. Tratamiento: vino de quina y elixir de Boldo ana 50.00 gram.; valerianato de amoniac 1.00 gram. Jarabe de corteza de naranja amarga q. s. para tomar cucharada cada dos horas. Alimento: jugo de carne y vino tinto.

En la noche: temperatura á 38°2; pulso á 80; respiracion normal; *mucho sueño*. El mismo ligero soplo en el pulmon; poca expectoracion y bien aerea-da. El mismo tratamiento.

Dia 16, 9º de enfermedad.—Fuí llamado á las cinco de la mañana por haberse agravado el enfermo, quien al exámen presentaba lo siguiente: lividez y semblante descompuesto; sudor muy copioso y helado; coma vigil carfología; pérdida de conocimiento, no contestando á nada; perdida la radial; respiracion entrecortada, brusca, nula en algunos momentos, y, lo más alarmante, la temperatura axilar que fué de 34°; todo el cuerpo cianosado y con mayor color azul en los lábios y uñas de las manos y de los piés; meteorismo muy pronunciado en el vientre; en el pulmon todos los signos de una congestion; supresion completa de expectoracion.

Viéndome al frente de una perniciosa de forma álgida, prescribí: bromhidrato de quinina 4 gramos; infusion fuerte de café 100; alcohol 30; para cucharada cada cuarto de hora. Introduje por inyeccion hipodérmica sobre la espina dorsal un escrúpulo de bromhidrato de quinina disuelto en la menor cantidad posible de agua destilada; friegas repetidas con tintura de quina, de cantáridas,

de almizcle, de mostaza y amoniaco. Lavativa cada hora, compuesta: de cocimiento de raiz de valeriana 30 gramos; alcohol 15. Una cucharada de cognac cada dos horas. Coloqué á uno de mis ambulantes á su cabecera, é hice que cada hora tomase la temperatura, cuyas cifras apuntó con todo escrúpulo, y observadas, puedo asegurar que cada hora fué ascendiendo 1 décimo de grado, presentando á las seis de la tarde la temperatura de 35°5; pulso filiforme; respiracion ménos fatigosa; alguna expectoracion aereada; ninguna tos; poca orina, rosada; evacuó el cuerpo dos veces por las lavativas; percusion y auscultacion normales; mucha debilidad; sordera muy pronunciada, pero hablándole fuerte ha contestado algo.

Tratamiento: bromhidrato de quinina 2 gramos en diez y seis pildoras, para tomar ocho á las doce de la noche y ocho á las cuatro de la mañana del siguiente dia; vino de quina y cognac en cucharadas cada dos horas, y dos veces más la friega de en la mañana.

Dia 17, 10° de enfermedad.—Temperatura á 35°7; pulso y respiracion como en la noche; la misma debilidad; algun sudor viscoso pero ménos frio; evacuó y orinó poco; auscultacion y percusion como en la noche.

Tratamiento: vino de quina 100 gramos; extracto de la misma 1; elixir de Boldo 30; para tomar cucharada cada dos horas; jugo de carne; una yema de huevo batida cruda en jerez seco; en el resto del dia té de damiana con leche bien desengrasada.

En la noche: temperatura 35°9; muy poco sudor; pulso 64; respiracion normal; ligero estertor crepitante en el pulmon.

Tratamiento: bromhidrato de quinina 1 escrúpulo, en diez pildoras para tomarlas á la una de la mañana del siguiente dia. Las mismas cucharadas de quina.

Dia 18, 11° de enfermedad.—Temperatura 36°; pulso á 68; respiracion normal; poca submatitez en el pulmon, y se percibe bien el estertor crepitante de retorno; esputo bien aereado y más limpio sin ninguna sangre; tiene hambre y deseo de que se le siente en la cama; poca tos; orina más abundante y rosada. El mismo tratamiento del vino de quina.

En la noche: temperatura 36°5; en lo demás igual á la mañana. Ningun tratamiento.

Dia 19, 12.° de enfermedad.—Temperatura á 36°; pulso á 72; respiracion normal; esputo más abundante y aereado, pero la tos aumentó desde las tres de la mañana que sopló mucho viento y la casa no está bien cubierta; ha sentido por efecto de la tos otra vez el dolor en el costado y está fatigado.


Tratamiento: inyeccion hipodérmica de morfina en el sitio del dolor y cucharaditas cada hora de: jarabe balsámico 30 gramos; goma amoniaco 1; polvo de Dower 5 dicigramos.

En la noche: temperatura á 36°4; pulso á 68; respiracion normal; esputo

OBSERVACION

DE

UNA PULMONIA DE FORMA INTERMITENTE, PERNICIOSA, ALGIDA.



LIT. DE MORGUIN.

Acapulco.

Mmanuel A. Ortiz.

abundante, bien aereado. Ha vuelto el dolor con más fuerza que en la mañana. Tratamiento: un vejigatorio sobre el sitio del dolor.

Día 19, 13.º de enfermedad.—Temperatura 35.6; pulso muy pequeño y algo de sudor frio en todo el cuerpo; no durmió despues de media noche. Ningun dolor en el costado, habiendo levantado bien el cáustico, cuya ámpula solo piqué. Auscultacion y percusion nada notable; esputo abundante y limpio; alguna debilidad.

Tratamiento: bromhidrato de quinina 30 gramos, en 1 onza de café fuerte, para tomarlo luego, fricciones tónicas y excitantes; la misma alimentacion que en la vispera.

En la noche: temperatura á 37.º; pulso á 72; poca tos; esputo más escaso pero espumoso, bien aereado; orina más limpia y en cantidad regular. Tratamiento: bromhidrato de quinina 4 gramos, en ocho pildoras para tomar al siguiente dia á la una de la mañana

Día 20, 14.º de enfermedad.—Temperatura á 36.º; pulso á 68; poca tos; carácter bueno de expectoracion; ningun dolor; mucha hambre.

Tratamiento: las mismas cucharadas de vino de quina. Alimentacion: jugo de carne; consomé; dos yemas de huevo crudo en vino y algo de galleta fina; té de damiana con leche.

En la noche: temperatura á 36.5; esputo bien aereado y abundante; ningun dolor; respiracion y pulso normales. Ningun tratamiento.

Días 21, 22 y 23, nada notable, y las temperaturas que con todo escrúpulo he puesto en el cuadro adjunto. En estos tres dias solo seguí un tratamiento tónico, aumentando el alimento, y el 23 lo di de alta.

Acapulco, Febrero 14 de 1882.

MANUEL A. ORTIZ.

CLÍNICA EXTERNA.

ALGO SOBRE TALLA.

La buena acogida que hizo esta Academia á la piedra que tuve el honor de presentarle últimamente extraida de una vejiga de mujer por el Dr. Martínez del Rio en el hospital «Gonzalez Echeverría,» me hizo pensar en presentar una pequeña coleccion de cálculos, con las notas correspondientes.

Como se verá por esta Reseña, la talla mediana fué la única empleada en el hombre para todos estos cálculos, y otro que no figura en esta coleccion, y la talla uretral para las mujeres. Sin embargo, se notan cálculos de dimensiones