

EL CLORAL.

FORMULAS.—ASOCIACIONES.—ANTAGONISMOS.—CONTRAINDICACIONES.

1º *Prescripciones para los adultos.*—*Via digestiva.*—Cloral como somnífero, 2 gramos á 2 gramos 5 en un jarabe todas las noches. Como anti-convulsivo, 0 gr. 2 á 0 gr. 5 cada dos horas, hasta la dosis de 6 á 8 gramos al día, 8 gramos siendo ya una dosis excesiva. Sin embargo, se ha llegado como somnífero, para los locos agitados hasta esa dosis enorme de 8 gramos, que no siempre ha dado buenos resultados, aun cuando estaba combinada con la morfina en la proporción de 1 gramo con 0 gr. 003 á 0 gr. 006 morfina.

2º *Contraindicaciones.*—Por un empleo prolongado, el cloral provoca con frecuencia desconciertos *gástricos*, la irritación de la garganta y asco. Está completamente contraindicado en las gastritis, las dispepsias, las úlceras del estómago, principalmente si existen hematemesis. De un modo general, lejos de calmar los dolores del estómago, los aumenta y se le debe proscribir.

Enemas de cloral.—En estos casos, se han preconizado los enemas (1 á 3 gramos de cloral con 80 á 100 centilitros de agua). El efecto hipnótico en estos casos se manifiesta más tarde (Porta): por este medio repetido la mucosa rectal acaba de irritarse y provoca el tenesmo. Sin embargo, se puede atenuar esta irritación añadiendo mucilago de goma al líquido del enema.

Continuación de las contraindicaciones generales.—Cardiopatías.—Dispepsias.—Anemias.—Debilidades.

3º *Aplicaciones cutáneas y subcutáneas.*—Las inyecciones subcutáneas constituyen un mal método. Como calmante, en solución, en los dolores de muelas, de oídos, ó también en pomadas, el cloral no tiene más que un valor mediano.

4º *Fórmulas contradictorias y asociaciones farmacéuticas.*—Evítese asociar á las soluciones concentradas de cloral el *alcohol* y el *bromuro de potasio*; el líquido puede en tal caso separarse en dos capas conteniendo la superior la mayor parte del cloral. *Agítese.*

La asociación del cloral con la atropina (ó la belladona) constituye un verdadero antagonismo terapéutico. La atropina puede salvar á los animales cloralizados (Huseman y Kruger) y á los hombres intoxicados accidentalmente (Mackensie, Routh).

5º *Recetas para los niños.*—Soluciones de cloral á 5%:

- 1 Recién nacidos, 0 gr. 03 á 0 gr. 06 por dosis.
 - 2 Niños de teta, 0 gr. 06 á 0 gr. 020.
 - 3 Niños hasta de 6 años de edad, 0 gr. 24 á 0 gr. 40.
 - 4 Desde 10 á 12 años, 0 gr. 50 á 1 gramo.
- Fraccíonense las dosis.

Dr. G. Sée (*Med. mod.*)