

## REVISTA EXTRANJERA.

### Tratamiento de la corea de Sydenham.

Casos ligeros: 1º reposo intelectual y físico; 2º baños sulfurosos; 3º algunos tónicos (preparados de quina y arsénico).

Casos medianos: 1º el mismo tratamiento higiénico y gimnástica metódica; 2º si el insomnio es persistente: bromuro de potasio (no continuarlo o largo tiempo); 3º

Valerianato de zinc.....	} a. a. 1 gm.
Extracto de beleño.....	
Subnitrate de bismuto.....	

En treinta píldoras, tres á seis por día. (Descroizilles); 4º el arsénico está indicado bajo la forma de arseniato de soda, de tres á diez miligramos no aumentando la dosis sino progresivamente; 5º pulverizaciones de éter y cloruro de metilo á la columna vertebral.

Casos graves: 1º antipirina dos ó tres gramos diarios en dosis fraccionadas ó si el niño no puede tragar las obleas:

Antipirina.....	10 á 20 gramos.
Jarabe de azahar.....	100 c. c.
Agua de tilo.....	200 c. c.

De una á tres cucharadas al día, durante diez días; 2º cloral según el método de Joffroy: Se hace una solución de cloral puro y se mezcla con una jalea espesa de grosella de manera que cada 20 gramos, (una cucharada de sopa) de jalea contengan un gramo de cloral. Se administra 4 gramos de cloral á los niños de diez años, 2 gramos por la tarde, 1 al medio día y 1 por la mañana. Para los niños de seis á siete años la mitad de la tercera parte de la dosis. Está contraindicada si hay complicaciones cardiacas; 3º envolver al paciente mañana y tarde en una manta mojada con agua á la temperatura de 10 á 12 grados, á los dos ó tres minutos se fricciona la piel y se envuelve al paciente en una manta de lana durante media hora (Joffroy); 4º inhalación de cloroformo en los casos más graves.

Se tendrán en cuenta las complicaciones cardiacas consecutivas á la corea á fin de combatir las desde el principio por un tratamiento local apropiado.—(Unión Méd.).