

GACETA MÉDICA DE MÉXICO.

PERIÓDICO

DE LA ACADEMIA N. DE MEDICINA DE MÉXICO.

CLINICA TERAPEUTICA.

TRATAMIENTO DEL TIFO.

SEÑORES:

EN la sesión del 28 de Junio del año próximo pasado tuve la honra de presentar á esta ilustrada Academia un estudio de Clínica terapéutica que titulé: "Tratamiento antiséptico del Tifo." En él daba cuenta de los resultados obtenidos hasta esa fecha con un método que llamo antiséptico y reconstituyente.

Para justificar ese tratamiento presenté en extracto los diferentes trabajos practicados en Europa por diversos bacteriologistas en la investigación del germen patógeno del tifo exantemático, y como de tales estudios se podía sospechar que ya fuese un spirilus, una bacteria ó un cocus, pues hasta entonces no estaban de acuerdo los observadores, lo averiguado era que existía siempre en la sangre de los tíficos un microorganismo á quien pudiera acusarse de ser el agente infeccioso y patógeno del tifo. Como además juzgando por la analogía que existe entre esta enfermedad y las afecciones aceptadas como infecciosas, se podría tomar al tifo también como enfermedad parasitaria é infecciosa; creí que se debía abandonar en su tratamiento el método expectante y la medicación sintomática empleados hasta entonces y poner en práctica lo que hoy aconseja la ciencia con el nombre de antiseptia.

De este orden de ideas surgió en mi mente la de someter á los enfermos de tifo encargados á mi cuidado á una serie de preceptos que tendie-

ran á desinfectar la atmósfera en que estaban colocados, las ropas de que hacían uso, su piel, su boca y el canal digestivo hasta donde era dable, sin olvidar sostener sus fuerzas tanto por la alimentación apropiada á cada caso, como por el uso de los tónicos reconstituyentes.

Los resultados correspondieron á estas concepciones como lo demostraba en el estudio á que me vengo refiriendo, el número de enfermos curados y la suma bien pequeña de las defunciones.

Hoy siento robustecida mi opinión á propósito de la naturaleza parasitaria del tifo, desde que tuve conocimiento de la comunicación hecha en el último Congreso Médico verificado en Roma, en donde nuestros médicos nacionales allí presentes pudieron escuchar de boca de M. Calmet las palabras siguientes: "Todos los microorganismos encontrados en la sangre de los tíficos por Brautlecht Hlava, Cornil y Babes, Combemal, Bruhl y Dubief, pueden ser considerados como formas disociadas de un sólo elemento spirular visto y descrito por M. Thoinot y por mí en 1892 y por Lewaschen de Kazan en el curso del mismo año.

"Un cultivo de sangre tífica abandonado por 12 meses en un caldo láctico permite á uno darse cuenta de este curioso fenómeno de polimorfismo."

Esta declaración y los resultados que paso á dar á conocer á la Academia hacen justicia á las conclusiones de mi anterior estudio y confirman las actuales.

Habiendo proseguido mis observaciones en los enfermos á mi cargo desde la fecha mencionada hasta la presente, he podido formar los cuatro cuadros estadísticos que tengo la honra de presentar, en los cuales se pueden encontrar datos importantes para la historia de la enfermedad; por ejemplo, en ellos puede saberse en qué edad es más frecuente y más peligrosa, cuál sexo es más atacado, cómo pueden influir, para el curso y terminación del mal, las condiciones del enfermo respecto á su constitución y temperamento, la forma dominante que ha revestido, su duración más general, y por último la cifra de mortalidad acaecida en los 236 casos observados.

Es de notarse á este respecto que en el presente año en los primeros meses los casos de tifo disminuyeron, pero se acentuó mucho su gravedad haciendo mayor número de víctimas.

Si á los favorables resultados que arrojan los citados cuadros añadimos las importantes conclusiones de M. Calmet, que acabo de referir, no repugnará á las ilustradas personas que me hacen el favor de escuchar-

me, que hoy, como en el trabajo presentado el 28 de Junio de 1893, termine con las siguientes conclusiones:

1ª El tifo es una enfermedad infecciosa y muy probablemente parasitaria.

2ª Su tratamiento racional debe ser el antiséptico asociado al tónico y reconstituyente.

México, Junio 27 de 1894.

JOSÉ M. LUGO HIDALGO.

ACADEMIA N. DE MEDICINA.

Sesión del día 13 de Febrero de 1895. — Acta núm. 20. — Aprobada el 20 de Febrero de 1895.

Presidencia de los Sres. Lavista y Francisco de P. Chacón.

Se abrió la sesión á las siete y veinte minutos de la noche, dándose lectura al acta de la anterior, la que fué aprobada sin discusión.

El señor secretario anual dió cuenta con las publicaciones recibidas, las que pasaron á la Biblioteca á disposición de los señores socios.

El suscrito dió cuenta de haberse recibido por correo un ejemplar del Smithsonian Report 1893, y un trabajo del Sr. Dr. Mount Bleyer, de Nueva York, sobre un nuevo remedio contra la difteria. El Sr. Presidente ordenó se haga la traducción de dicho trabajo para publicarlo.

El Sr. Dr. D. Manuel Villada dió lectura al suyo, titulado: "Apuntes acerca de especies indígenas de la familia de los Helechos empleados en la Medicina," el cual quedó comprendido en la fracción I del artículo 18 del Reglamento.

El Sr. Presidente preguntó si alguno de los señores socios deseaba hacer alguna observación al trabajo del Sr. Dr. Villada; ninguno hizo uso de la palabra.

El Sr. Dr. Lavista relator de la Comisión de Patología y Clínica quirúrgicas leyó la primera parte del dictamen acerca de la Memoria que remitió á la Academia el Sr. Dr. Pagenstecher.