

de sal de cocina, sin perjudicar en nada á su acción anestésica: esta propiedad es, sobre todo, muy útil en los casos de operaciones extensas en regiones no inflamadas ó en los músculos, tejido subcutáneo, vainas tendinosas, etc.

Las jeringas (de 5, 10 y 50 gramos) se esterilizan limpiándolas varias veces en una mezcla á partes iguales de agua fenicada al 5 por 100 y alcohol absoluto.

Para hacer indolente la introducción de la cánula, anestesia el autor el sitio de la picadura dirigiendo previamente sobre él una corriente de cloruro de etilo ó de éter. Se protegerá cuidadosamente con la glicerina, ó aplicando el éter, los puntos que provoquen una sensación de quemadura, el escroto, los labios grandes y pequeños, el ano, las glándulas mamarias y el cuello. Se harán indolentes las picaduras en la mucosa aplicando previamente un grano de cocaína ó una gota de ácido fénico concentrado. Esto es especialmente útil en los sujetos muy sensibles ó en los niños.—
(*Siglo Médico.*)

COLORIFORMIZACION SIN RIESGO.

El Dr. Maurange, en el *Cin. Lancet*, recomienda como muy eficaz, aplicar 15 minutos antes de anestesiar al paciente, una inyección hipodérmica de la siguiente solución:

Sulfato neutro de esparteina.....	0,08 centígr.
Muriato de morfina.....	0,01 „
Agua esterilizada	5,00 gramos.

Debe inyectarse un centímetro cúbico.

En 106 operaciones que se han llevado á cabo haciendo previamente la inyección formulada, antes de practicar la anestesia, no ha habido un solo caso en que se haya observado el menor síntoma temible, ni aun desagradable, por mucho tiempo que se haya prolongado el estado anestésico.
