

cisión oblicua á 3 6 4 centímetros del arco de Falopio semejante á la que recomienda Mac Burn para la apendicitis. Refirió que tiene en su servicio del Hospital de San Andrés tres enfermos que se salvaron por medio del ano artificial, uno de ellos con los signos de una tuberculosis del ciego; diagnóstico que cree será comprobado cuando se concluya el examen bacteriológico que ha mandado hacer.

Dirigiéndose al Sr. Hurtado manifestó que le parecían peligrosas las punciones que había practicado, pues pudiera haberse hecho un derrame en la cavidad.

En cuanto al proceder que empleó el suscrito en el segundo enfermo le parece habría sido conveniente usar las pinzas especiales de Hopkins que con su vaina de hule defienden bien la pared intestinal.

Asistieron los Sres. Aragón, Altamirano, Chacón F. de P., Chacón A., Gayón, Gaviño, Hurtado, Lavista, Noriega, Núñez, Olvera, Parra, Prieto, Ramos, Reyes, Ruiz, Toussaint, Troconis, Villada y el secretario que suscribe.

J. R. ICAZA.

---

Sesión del día 29 de Mayo de 1895. — Acta núm. 34. — Aprobada el día 5 de Junio de 1895.

Presidencia del Sr. Dr. D. Manuel Villada.

Se leyeron las comunicaciones recibidas, y se levantó la sesión en señal de duelo por el fallecimiento del Sr. Dr. D. Antonio Caréaga, socio titular de esta Academia, acaecido el 25 del presente Mayo.

J. R. ICAZA.

---