

GACETA MEDICA DE MEXICO.

PERIODICO

DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE MEXICO.

Tomo XXXV

MÉXICO, 15 DE MAYO DE 1898.

Número 10

Acta núm. 27.

SESIÓN DEL DÍA 13 DE ABRIL DE 1898.

(Presidencia del Sr. Dr. Lavista.)

Lecturas por los Sres. Dres. Malanco y Ortega.—Presentación por el Sr. Zárraga de una enferma operada de un fibro-mioma uterino.—Discusión.

EL SR. DR. FERNANDO MALANCO dió lectura á su trabajo titulado «Algunas reflexiones sobre la viruela y la vacuna.»

EL SR. DR. ZÁRRAGA presentó una enferma á quien le extirpó un miofibroma por el procedimiento de Doyen, al que considera muy ventajoso. Haciendo la descripción del manual operatorio dijo: que en el 1.^o tiempo de la operación hizo la abertura del vientre; en el 2.^o la del fondo de Douglas, al que hizo saliente por medio de una pinza curva que puso en el fondo posterior de la vagina; en el 3.^o tomó el cuello y lo desprendió de las inserciones vaginales y de la vejiga; en el 4.^o hizo la separación de los ligamentos anchos; en el 5.^o tiempo formó los pedículos tubo-ováricos, extirpó los anexos é hizo la hemostasia, en el 6.^o suturó en bolsa el embudo peritoneal, cuidando de que el pedículo quedara hacia la vagina; y por último, en el 7.^o cerró el vientre y taponó la vagina con gaza idoformada.

La enferma curó sin tener la menor calentura. Cuando se extirpó el tumor pesaba 10 libras y era muy grande; en la actualidad ha disminuido notablemente de volumen.

La pieza anatomo-patológica fué presentada á los Sres socios.

EL SR. PRESIDENTE nombró en comisión al Sr. Dr. D. Alberto López Hermosa para que hiciera el examen de la enferma, después del cual informó: que la cicatriz de la pared abdominal es

perfecta, sin que haya temores de eventración; que en el fondo de la vagina se toca una cicatriz umbilical muy regularizada, y que por la palpación bimanual se convenció de que habían sido extirpados los anexos. Felicitó después al Sr. Zárraga por el brillante éxito que ha obtenido.

EL SR. DR. LAVISTA manifestó que el procedimiento de Doyen, en el que se separa completamente el útero de la vagina sin dejar ninguna parte del cuello, es muy ingenioso.

Hizo algunas consideraciones acerca de las ventajas é inconvenientes que puede tener el dejar los anexos, y suponiendo que se les conservó en la enferma del Sr. Zárraga, preguntó á este señor el por qué de su modo de proceder.

EL SR. ZÁRRAGA aclaró que sí había hecho la extirpación de los ovarios y de las trompas.

EL SR. DR. LÓPEZ HERMOSA dijo: que efectivamente el Sr. Mejía y él comprobaron la ausencia de los anexos del útero, y agregó que en tésis general, es partidario de su conservación siempre que estén sanos.

El suscrito dió lectura al trabajo del Sr. Dr. D. Andrés Ortega, socio correspondiente en el Valle de Santiago, titulado "Epistaxis."

EL SR. TERRÉS hizo notar que el deseo del Sr. Ortega de que se estudie la yerba del pollo ya está realizado, pues en el Instituto Médico Nacional se ha hecho un estudio completo de ella. Dijo después que basta machacar esa planta para extraer un jugo que obra muy bien como hemostático.

EL SR. DR. LUGO manifestó que al hacer la castración de unos toros en la Escuela N. de Agricultura, tuvo oportunidad de comprobar que la yerba del pollo tiene realmente propiedades hemostáticas muy notables.

J. R. ICAZA.
