

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

ASUNTOS CIENTIFICOS

TRATADOS EN LA

SESION DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 1902.

El Dr. Altamirano leyó un trabajo titulado: "Un caso de Ozena verminosa. Su tratamiento."

El Dr. Villarreal presentó tres enfermas por él operadas: una de sarcoma de la matriz, y las otras dos de epiteloma del cuello. En todas se hizo uso de la raquicocainización.

En la primera, de 55 años, operada en 4 de Octubre próximo pasado, se practicó la extirpación de la matriz por la vía vaginal, habiendo sido dada de alta, por curación, el 24 del mismo mes.

La segunda, de 51 años, ofreció detalles muy interesantes al ser operada, pues al extirpar la mitad de la vagina para llegar al cuello, por medio de laboriosísima disección, se encontró una unión completa de la vagina y la vejiga, y al hacer la disección, se adelgazó y perforó la última, habiendo necesidad de suturarla. Se continuó la disección, se ligaron las arterias uterinas y la base del ligamento ancho; se hizo forcipresura de la base del ligamento ancho derecho, se luxó luego la matriz, previo despedamiento del cuello; se ligó la parte del ligamento ancho incluyendo la trompa y el ovario; se ejecutó la resección de éste y la extirpación del útero, ligando antes las arterias uterinas. La operación concluyó, exigiendo el estado de la enferma, que se le hicieran inyecciones de éter y de suero artificial. Días después, á esta misma enferma, portadora de una hernia inguinal, se le practicó la operación de la cura radical.

La tercera enferma tiene 39 años de edad, fué operada el día 7 de Octubre del corriente año. Se practicó la amputación del cuello con el termo-cauterio. Se disecó una parte de la vagina; se ligaron las arterias uterinas; se hizo una sección muy alta del peritoneo vesical anterior, la luxación de la matriz y la ligadura del ligamento redondo derecho y del infundíbulo pélvico del mismo lado. Igual operación se efectuó del lado izquierdo, terminando con la sutura del peritoneo vesical-anterior, del

corte vaginal y vesical-posterior, del peritoneo de Douglas y de los ligamentos anchos.

Fueron nombrados para examinar á las enfermas los señores Gutiérrez y Troconis.

Suspendióse la sesión algunos minutos y concluido el examen, tomó la palabra el Dr. Gutiérrez quien examinó á la primera enferma, asegurando que el buen éxito de la operación era completo, habiendo comprobado la falta de los órganos extirpados.

Habló en seguida el señor Troconis, que estudió las otras dos enfermas, encareciendo la circunstancia del éxito de la operación de la cura radical de la hernia en una de las operadas y felicitando al Dr. Villarreal por su habilidad operatoria.

El señor Presidente, comprendiendo la importancia de los casos presentados, expresó el deseo de que el señor Villarreal los particularizara y ampliara.

El Dr. Villarreal, después de dar las gracias á los señores Gutiérrez y Troconis por los elogios que de sus operaciones hicieron, promete presentar un estudio especial acerca del cancer uterino para lo cual posee abundante material.

Se leyeron los turnos de lectura y se levantó la sesión á las 8 y 30 minutos p.m., habiendo asistido los señores Doctores Altamirano, Gutiérrez, López Hermosa, Lugo, Orvañanos, Ramos, Ramírez Arellano Nicolás y Juan José, Troconis, Urrutia, Villarreal y el Secretario que suscribe.

J. M. BANDERA.

CLINICA INTERNA.

LA ANURIA EN EL TIFO EXANTEMATICO,

SU VALOR SEMEIOTICO Y PRONOSTICO.

En los últimos meses del año próximo pasado y en los primeros del presente, hemos presenciado la exacerbación que el tifo presentó en la capital, revistiendo casi la forma epidémica.

En los varios casos que tuve que tratar, llamó mi atención, la frecuencia con que se presentó la anuria, y aunque en otras ocasiones