

ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA AMIBIASIS HEPÁTICA

VII

CONCLUSIONES*

DR PEDRO RAMOS

ENTRE LOS ASPECTOS que hemos querido realzar se encuentran los de adquisición reciente sobre biología e inmunología de la *Amiba Histolytica* que tienden a penetrar en el problema de las circunstancias que favorecen su afinidad por el hígado, que si son interesantes por sí mismas, lo son más para nosotros por haber sido realizados en nuestro medio. Las investigaciones de laboratorio permitirán orientar la investigación clínica hacia la explicación de las incógnitas que actualmente nos planteamos.

La sospecha clínica continúa siendo la base del diagnóstico. Los ponentes que se han ocupado de la clínica y de las pruebas de funcionamiento del hígado han insistido en la necesidad de tener en cuenta a la amibiasis al hacer diagnóstico diferencial de padecimientos hepáticos.

El diagnóstico de certidumbre es dado por procedimientos que no se encuentran en todo momento a nuestro alcance, la afirmación de una sospecha lograda por una terapéutica afortunada es valiosa. Exámenes costosos de laboratorio y gabinete, como son los de la medicina actual, se encuentran al alcance de muchos que antes no habrían podido beneficiarse de ellos, gracias a una reforma que los ha hecho llegar a más amplios sectores de población.

La terapéutica ha sido bien revisada y resalta la necesidad del tratamiento con los recursos que han probado ser efectivos, probablemente por su abandono se explique la persistencia actual de la enfermedad.

* Presentadas por su autor en la sesión del 23 de septiembre de 1964.

Debemos insistir en que la terapéutica sea apropiada, que no sea insuficiente así como en proscribir la automedicación.

La amibiasis hepática, derivada de la amibiasis intestinal, es un problema de salud pública que encuentra su explicación en cuestiones de orden médico, económico, social, que para ser combatido amerita la satisfacción de esos factores en demérito unida a una terapéutica efectiva. Otros padecimientos ligados a esos mismos factores han comenzado a disminuir.

El crecimiento de la población especialmente a expensas de inmigrantes rurales, la falta de alimentación adecuada, la carencia de medios para proporcionar niveles sanitarios mejores, la falta de educación higiénica, el alcoholismo, que favorecen estas mismas condiciones, son defintivos para mantener la enfermedad. La corrección de estos factores al mismo tiempo que proporcionará mejores bases para el desarrollo podrá traer entre sus consecuencias la disminución y aún la desaparición de este padecimiento.