

Amibiasis

Primeras monografías sobre absceso hepático

Un padecimiento frecuente en México y a cuyo conocimiento han contribuido en forma muy distinguida los médicos mexicanos, es la amibiasis y sus muy variadas complicaciones. Se enumeran cuatro prioridades mexicanas sobre amibiasis. La primera se remonta a 1790. Todas ellas son prioridades mundiales y en ello radica su trascendencia. En el año de 1790 el protomedicato de la nueva España convocó un concurso para disertar sobre "la horrorosa y tenacísima enfermedad que de algún tiempo acá nos aqueja". Se refería el protomedicato a las obstrucciones inflamatorias del hígado, es decir, a los abscesos hepáticos: de las disertaciones (tesis) presentadas, dos fueron las premiadas con iguales honores: la del ilustre médico potosino don Joaquín Pio Eguía y Muro, catedrático de vísperas de medicina de la Real y Pontificia Universidad de México, médico del Hospital San Andrés y protofiscal del real tribunal del protomedicato. La otra tesis premiada fue la del laureado don Manuel Moreno, profesor público de cirugía, director del real anfiteatro anatómico, primer cirujano de los reales hospitales de naturales y del hospital San Andrés.

Ambos hicieron amplia exposición epidemiológica con atinadas observaciones clínicas y ambos

insisten en el muy sombrío pronóstico de la enfermedad. Eguía y Muro hizo una notable observación que será analizada por separado.

Don Manuel Moreno por su parte tras de una dramática exposición del lamentable y lastimoso estado de los pacientes al final de su evolución insiste "que se envíen a operar a los enfermos antes de que se haya inficionado la masa de la sangre con la caquexia y que hayan venido aquejados de diarreas disenterías y esputos ni que las fuerzas hayan caído demasiado" y agregó juicioso y muy atinado: es oportuno resolverse a ejecutar semejante operación (el drenaje) con mucha mayor anticipación de lo que hasta aquí sin aguardar aquel cúmulo de condiciones.

Requistos que llevan a la caquexia. El buen don Manuel Moreno, hace dos siglos clamaba por la aplicación de un principio fundamental por el que continuamos clamando los cirujanos actuales: ¡por una pronta y oportuna indicación quirúrgica!

Estas monografías fueron las primeras en el mundo sobre el absceso hepático seguramente amibiano. Marcan el inicio de una ilustre trayectoria en la que se han distinguido notablemente los médicos mexicanos.

* Académico titular

Correspondencia y solicitud de sobretiros. Dr. Fernando Quijano Pitman, División de Estudios de Postgrado e Investigación, Facultad de Medicina, UNAM, Unidad de Posgrado, primer piso, C. U., 04510, México, D. F.

Pericarditis amibiana

En la tesis de don Joaquín Pío Eguía y Muro se encuentra la primera observación hecha en el mundo de la perforación del absceso hepático en la cavidad pericardial y la pericarditis seguramente amibiana. Dice así el doctor Pío Eguía y Muro: "muchos cadáveres se ha examinado y se ha observado en ellos, daños a las partes vecinas como se notó en el año '83 y aún habiendo evacuado los pacientes en la copia que he dicho con todo, se ha encontrado pus en notable porción de los cadáveres y a veces el pericardio lleno de iél". He aquí otra notable primicia médica mexicana: la primera mención en el mundo de la pericarditis complicando abscesos hepáticos y añade: "La mayor malignidad de las diarreas y disenterias han tenido también copiosos esputos de un material de muy mal aspecto y fetor". Seguramente abscesos abiertos a bronquios.

La literatura extranjera atribuye erróneamente a Rouis de Argel la primera publicación de una pericarditis por ruptura de un "absceso tropical". La publicación de Rouis fue hecha en 1860, es decir, 70 años después de Eguía y Muro.

Estas dos primicias médicas mexicanas mundiales son un honor muy distinguido de nuestra medicina.

Referencias

1. Eguía y Muro JP. Disertación sobre las obstrucciones inflamatorias del hígado. México 1790
2. Moreno M. Disertación sobre las obstrucciones inflamatorias del hígado. México. 1790.
3. Rouis E. citado por Vergozp y Harmanjt GRP. De la ruptura de abscesos amibianos de los sereuses. Rev Chir Paris. 1932;70:680-692.

Punción de los abscesos hepáticos

La punción evacuadora de los abscesos hepáticos se debe a un gran maestro de la medicina mexicana: don Miguel F. Jiménez, quien desde 1842¹ propuso y realizó esta maniobra terapéutica. Describe con detalle la forma de localizar el sitio adecuado, la técnica de la punción; años después modificó la técnica, para evitar las punciones repetidas dejaba *in situ* la camisa del trocar para obtener una drenaje continuo de la colección.

La punción evacuadora cambió en forma muy ostensible y favorable del pronóstico de este padecimiento cuyo pronóstico era casi fatal de necesidad y con la punción don Miguel bajo la mortalidad de 30%, cifra muy notable y muy baja para esa época, pues no se conocía el agente etiológico ni se contaba con medicamentos eficaces para combatir la amibiasis.

En el extranjero la evacuación de los abscesos hepáticos fue propuesta muchos años después por Stromeyer Little de Shagai² en 1880 y por Patrick Manson en la India en 1903³.

Es una prioridad que honra a la medicina mexicana y a su insigne autor.

Referencias

1. Jirnénez MF. Absceso del hígado en comunicación con los bronquios. Periódico de la Academia Nacional de Medicina 1842;1:229-242.
2. Stromeyer Little. Citado por Schwarz E. Chirurgie due foie O Doin Paris 1901;176.
3. Mason P. Citado por Keen's, Surgery Vol. V pag. 1109. Saunders Philadelphia & London. 1905

Diagnóstico clínico de la perforación de un absceso hepático al pericardio

Esta prioridad mundial se debe al gran clínico mexicano doctor Miguel Jiménez, quien hizo el diagnóstico durante la vida del enfermo, diagnóstico que fue confirmado por la necropsia, en 1856.

Un cochero se presentó a consulta con el doctor Miguel, aquejado de un dolor epigástrico severo, fiebre, y a la exploración física se encontró un "abultamiento", una masa retinente en el hipocondrio izquierdo y epigastrio; se diagnosticó un absceso hepático del lóbulo izquierdo del hígado que requería internamiento en el hospital. El enfermo rehusó internarse y se presentó cinco días más tarde quejándose de gran disnea y dolor precordial, el doctor Jiménez diagnosticó la ruptura del absceso dentro del pericardio, el paciente falleció a poco de ser internado en el hospital, y en la necropsia se confirmó el diagnóstico enunciado por don Miguel Jiménez: ruptura del absceso del lóbulo izquierdo del hígado dentro de la cavidad pericardica.^{1,2}

La literatura extranjera atribuye erróneamente a Gremillon³ el haber hecho el primer diagnóstico de perforación del absceso hepático en la cavidad pericardica. Gremillon hizo su observación en 1899, es decir, 40 años después del doctor Miguel Jiménez.

Esta prioridad mexicana honra grandemente a don Miguel Jiménez y a la medicina nacional.

Referencias

1. Jiménez MF. Clínica médica. Lecciones dadas en la Escuela de Medicina. Imprenta JM Murguía. México 1856
2. Jiménez MF. Abscesos del hígado. Lecciones dadas por el doctor Jiménez en la escuela de Medicina. La Unión Médica Mexicana. 1857 T II; 10=105 en varios números de la revista.
3. Gremillon E. These de Paris, 1899, citado por Schwarz E. Chirurgia de Foie. O. Doin Ed. Paris, 1901.